



DAI MEDICO GENERALE  
UO Endoscopia Digestiva – Borgo Roma  
Preparazione colonscopia

MU 304616 07

Rev. 2 del 02.01.2012

Pagina 1 di 1

Il grado di pulizia intestinale influenza la capacità diagnostica della colonscopia, la quantità di farmaci richiesti per l'esecuzione dell'esame e la probabilità di complicanze. **È pertanto indispensabile ottenere al termine della preparazione l'emissione di liquido trasparente;** la preparazione deve essere eventualmente incrementata fino all'ottenimento di tale risultato. In caso di emissione la mattina dell'esame di liquido non chiaro si consiglia l'esecuzione di clisterino medicato (Es. Sorbiclis)

Nei **3 giorni** precedenti l'esame : **dieta priva di scorie (non mangiare nè frutta, nè verdura, poca pasta e poco pane)**

Il **pomeriggio precedente** l'esame (dalle ore 15 circa) assumere per via orale uno dei seguenti preparati nelle dosi indicate:

| Nome del prodotto        | Dosaggio  | Modalità   | Note   |
|--------------------------|---|--|--|
| SELG ESSE 1000           | 4 buste   | 4 litri di soluzione (sciogliere 1 busta in 1 litro di acqua) da assumere in circa 4 ore   |  |
| ISOCOLAN                 | 8 buste   | 4 litri di soluzione (sciogliere 1 busta in 500 ml di acqua) da assumere in circa 4 ore  |  |
| MOVIPREP                 | 2 buste trasparenti (ciascuna contiene 1 busta A e 1 busta B) | Diluire la busta A assieme alla busta B in 1 litro di acqua e poi assumere almeno 1 litro di liquidi chiari. Dopo circa 2 ore ripetere l'operazione  |  |
| PICOPREP                 | 2 buste   | Diluire 1 busta in un bicchiere di acqua e nelle 2 ore successive assumere 2 litri di liquidi. Dopo 6 ore ripetere l'operazione  |  |
| LOVOL-ESSE<br>BISACODILE | 2cp + 4 buste   | Assumere 2 cp di bisacodile; dopo 4 ore assumere 2 litri di Lovol-Esse (1 busta in 500 ml)   |  |
| PHOSPHO-LAX              | 4 buste   | Diluire 2 buste in un bicchiere di acqua e nelle 2 ore successive bere 2 litri di liquidi. Poi ripetere l'operazione   | Non utilizzare negli anziani, nei cirrotici, nell'isuff.renale, nello scompenso cardiaco e nelle coliti attive |
| PURSENNID                | compresse   | 2 cp ogni 10 Kg di peso, tutte assieme bevendo 2 litri di liquidi nelle 2-3 ore successive. Eseguire clistere evacuativo da 1 litro di acqua tiepida 1 la sera prima e 1 la mattina dell'esame | Solitamente non garantisce una pulizia ottimale  |

Successivamente, fino al momento dell'esame, è raccomandata una dieta idrica con assunzione di tè, camomilla o caffè zuccherati, fino a 2 ore prima dell'esame.

Prima di eseguire l'esame si accerti presso il suo Medico Curante che la terapia farmacologica da Lei assunta sia compatibile con eventuale biopsia/polipectomia (Es. cumadin, plavix, doppia antiaggregazione).

**Il giorno dell'esame portare:**

- Impegnativa per l'esame endoscopico (colonscopia + ev.polipectomia + ev.biopsia) ed una per esame istologico
- precedenti referti di esami endoscopici, radiologici, ecografici ed esami ematochimici

**UN EVENTUALE TRATTAMENTO FARMACOLOGICO SEDATIVO E/O ANTIDOLORIFICO POTRA' ESSERE PRATICATO SOLO A PAZIENTI ACCOMPAGNATI DA UNA PERSONA ADULTA**

|                         |                         |              |            |
|-------------------------|-------------------------|--------------|------------|
| File                    | MU07-preparazione colon | Redazione    | Bernardoni |
| Data prima applicazione | 3/1/2012                | Verifica     | Gabbrielli |
| Copia                   | controllata             | Approvazione | Gabbrielli |